

Лошадиные



В Африке обитают три вида зебр: горная, пустынная и саванная. Это сравнительно небольшие полосатые лошадки. Живут небольшими табунами, состоящими из самца и нескольких самок. Несмотря на свою контрастность, черно-белая окраска прекрасно маскирует зебр в мареве травянистых саванн. Кроме того, различно окрашенные участки шкуры зебры нагреваются на жарком африканском солнце по-разному, это служит хорошим способом регулирования температуры тела животного.

Дикие предки домашнего осла обитали в пустынях Северной Африки. В небольшом количестве дикие ослы до сих пор встречаются в Сомали и Эфиопии. Как и многие пустынные копытные, они неприхотливы в выборе пищи и могут длительное время обходиться без воды.



Единственной современной дикой лошадью является лошадь Пржевальского, названная так в честь знаменитого русского путешественника, открывшего это животное в труднодоступных районах Северного Китая и Монголии в конце XIX века. Сейчас лошадей Пржевальского практически не осталось в природе, но они сохранились в зоопарках и питомниках. Предпринимаются попытки вернуть этих животных в природу.

Около пяти тысяч лет назад азиатские кочевники начали одомашнивать лошадей.

С тех пор выведено много пород – ездовых и рабочих. Самые большие лошади, высотой в холке около двух метров и весом более восьмисот килограммов, выведены в Северной Европе. Их использовали для извлечения из моря креветочных тралов.

Самые маленькие лошадки, выведенные в США, имеют высоту всего полметра и вес пять-семь килограммов. Их держат в квартирах в качестве домашних питомцев.