

## Приложения

### *Этапы и содержание работы по закладке яиц в инкубатор, выведению и выкармливанию цыплят*

#### 1. Закладка яиц

Яйца были взяты из – под несушки 13 августа 2007г. и заложены в инкубатор 16 августа 2007г. в 13ч 25 мин.



#### 2. Обслуживание инкубатора

- Контроль за постоянной температурой
- Переворачивание яиц через каждые 3 часа, чтобы зародыш не прилип к скорлупе
- Проветривание инкубатора 2 – 3 раза в день по 5 – 7 минут
- Контроль за влажностью воздуха внутри инкубатора

#### 3. Появление наклёвок

Первая наклёвка появилась 6 сентября 2007г. в 2 часа ночи (21 – е сутки). Следующие наклёвки появились в течение суток.



#### 4.Рождение цыплят

Первый цыплёнок вылупился 7.09.07г. в 1 час ночи (самостоятельно), двое – в 7 часов утра (одному пришлось помочь), последнего освобождали от скорлупы спустя сутки после появления наклёвки.



#### 5. Помещение цыплят в «грелку»

Вылупившиеся цыплята помещаются в «грелку» (кастрюлю, стоящую на водяной бане и выстеленную войлоком) для поддержания температуры, оптимальной для новорожденных птенцов. Спустя 12 – 15 часов их помещают в большую картонную коробку, в которой положена грелка или поставлена банка с тёплой водой, чтобы цыплята могли греться.

#### 6. Кормление цыплят

Цыплят начинают кормить на 2 – е сутки после появления на свет через каждые 2,5 – 3 часа с ночным перерывом с 21 часа до 7 часов утра.



#### Рацион питания:

1–й день – мелко нарубленное варёное яйцо

2–й день – добавляется пшённая каша без соли, сваренная на воде

3–й день – добавляется творог (домашний, приготовленный из кефира) и свежая зелень (пророщенный овёс)

В последующие дни в течение 2 недель эти виды корма можно сочетать в различных комбинациях. 1 – 2 раза в день можно давать простоквашу.

С 3 – го дня в корм добавляется витаминная мука для новорожденных птенцов «Солнышко» (приобретается в зоомагазине).

В жилище цыплят постоянно стоит поилка (блюде с водой). Воду нужно регулярно менять.